





CONTROLLO DEI PATOGENI
CRITTOGAME: PIEDE NERO-ERNIA, RIZOTTONIOSI, RUGGINE

Per quanto riguarda il controllo dei patogeni (funghi, virus, batteri,...) si ricorre principalmente a prodotti rameici e zolfo. In tale senso è importante ricordare il limite dei 6 kg di rame ad ettaro per anno fissato nella normativa comunitaria. Nei prodotti rameici i tempi di carenza oscillano fra i 3 e i 20 giorni. Per quanto riguarda lo zolfo i tempi di carenza sono all'incirca di 5 giorni. Si ricorda l'incompatibilità dello zolfo con prodotti quali gli oli minerali. Stessa nota per prodotti rameici quali la poltiglia bordolese ed alcuni idrossidi. Si rammenta comunque l'importanza di consultare sempre con attenzione l'etichetta.

Di seguito sono riportati alcuni dei principali patogeni e i relativi sistemi di controllo:

CRITTOGAME		
PIEDE NERO - ERNIA		
Colture interessate: Brassicacee		
Interventi preventivi: Eliminazione residui colturali		

CRITTOGAME	
RIZOTTONIOSI	
Colture interessate: Cipolle, Patate	
Interventi preventivi: Solarizzazione	
Trattamenti: Trichoderma harzianum <ul style="list-style-type: none"> • Trattamento in presemina del terreno • Trattamento dei bulbilli 	

CRITTOGAME			
RUGGINE			
			
Colture interessate: Cavoli			

Interventi preventivi: Eliminazione residui colturali

Trattamenti: Prodotti Rameici

(maggio 2009)

Vedi anche:

-Controllo dei patogeni: alternariosi, antracnosi, botrite

-Controllo dei patogeni: cercosporiosi, cladosporiosi, fusariosi

-Controllo dei patogeni: oidio, peronospora

-Controllo dei patogeni: sclerotinia, septoriosi, tuberosità radicale, verticilloso

-Controllo dei patogeni: batteriosi, virosi



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura